



ALOE FÉRTIL BRASIL

FERTILIZANTES ESPECIAIS
SPECIALTY FERTILIZERS

| CULTURA | INÍCIO DA APLICAÇÃO | QUANT. DE APLICAÇÃO | mL/100 L de água | L / ha | FASES DA APLICAÇÃO |
|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------|---|
| ABACATE | 30 dias após o plantio | 3 a 5 | | 1,0 a 1,5 | 15 em 15 dias |
| ABACAXI | 20 dias após o plantio | 4 a 6 | | 0,8 a 1,2 | 10 em 10 dias |
| ALGODÃO | V3 à V4 | 3 | | 1,0 a 1,5 | V3, R1 e R3 |
| ALHO | 30 dias após a emergência | 3 | | 1,5 a 2,0 | 15 em 15 dias |
| ALFAFA | 20 dias após o corte | 2 | | 1 | 10 em 10 dias |
| AMENDOIM | 30 dias após a germinação | 3 | | 1,0 a 1,5 | 4º folio esporão e florescimento |
| ARROZ | Perfilhamento | 3 | | 1,0 a 1,5 | Perfilhamento, definição floral e florescimento |
| BATATA | 30 dias após o plantio | 3 | | 0,8 a 1,2 | 15 em 15 dias |
| BERINGELA | 10 a 15 dias após o plantio | 2x por semana | 300-500 | | 2x por semana |
| CAFÉ | Pré-florada | 3 a 4 | | 1,0 a 1,5 | Pré-florada, florada, enchimento de grãos |
| CANA | | 3 a 4 | | 1,5 | Colmo, 40 dias do plantio e de 15 em 15 dias |
| CITRUS | Pré-florada | 4 a 6 | 300-500 | 1,0 a 1,5 | Pré-florada, florada, enchimento de frutos |
| FEIJÃO | V3 à V4 | 3 a 4 | | 1,0 a 1,5 | V3, V4 e V8, enchimento de grãos |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|---|
| FLORICULTURA | 10 a 15 dias após o plantio | 1x por semana | 300-500 | 1,0 a 1,5 | Semanal em todo o ciclo |
| GOIABA | Pré-florada | 1 | | 1,0 a 1,5 | Pré-florada, florada, enchimento de frutos |
| HORTALIÇAS | 10 a 15 dias após o plantio | 2x por semana | 300-500 | | 2x por semana |
| MANGA | Pré-florada | 3 a 4 | | 1,5 a 2,0 | Pré-florada, florada, enchimento de frutos |
| MANDIOCA | | 2 a 3 | | 1 | Maniva e 90 dias após o plantio |
| MARACUJÁ | Pré-florada | 1x por semana | 300-500 | 0,8 a 1,2 | 15 em 15 dias após 1ª florada |
| MELANCIA/MELÃO | 10 a 15 dias após o plantio | 3 a 4 | | 0,8 a 1,2 | 15 em 15 dias |
| MILHO | V3 à V4 | 2 a 3 | | 1,0 a 1,5 | V3 a V4 e V8 |
| MORANGO | Pré-florada | 1 a 2x por semana | 300-500 | 1,5 | Semanal após 25 a 30 dias do plantio |
| PASTAGEM | | 2 a 3 | | 1,0 a 1,5 | 2 aplicações a cada 15 dias de intervalo |
| PÊSSEGO | Pré-florada | 3 a 4 | | 1 | Pré-florada, florada, enchimento de frutos |
| PEPINO | 10 a 15 dias após o plantio | 2x por semana | 300-500 | | 2x por semana após 15 dias de plantio |
| PIMENTA E PIMENTÃO | 15 a 20 dias após o plantio | 2x por semana | 300-500 | | 2x por semana após 10 dias de plantio |
| SOJA | V3 à V4 | 3 | | 1 | V3, V4, V8, enchimento de grãos |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | | | | | 150mL em 100Kg de sementes |
| TOMATE | 10 a 20 dias após o plantio | 2x por semana | 300-500 | | 10 dias após plantio 2x por semana |
| TRIGO | 10 a 20 dias após o plantio | 3 | | 1,0 a 1,5 | 15 a 20 dias após plantio, de 15 em 15 dias |
| UVA | Pré-florada | Quinzenal | | 0,8 a 1,2 | 15 em 15 dias |